

مینجیکوکل مدافعتی ٹیکے

آپ کو کیا کچھ جاننے کی ضرورت ہے

دونوں مدافعتی ٹیکے اچھا کام کرتے ہیں اور ان کو لگوانے والوں میں سے 90% کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ MCV4 سے بہتر، دیرپا تحفظ کی توقع کی جاتی ہے۔

MCV4 بیماری کو ایک شخص سے دوسرے کو لگنے سے بچانے میں بھی بہتر ہے۔

3 مینجیکوکل مدافعتی ٹیکے کس کو لینا چاہئے اور کب؟

تمام بچوں کو اپنی نوبالغ عمر کے معمول کے دورے (11-12 سال کی عمر میں) میں MCV4 لگوانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ان کے لئے جنہوں نے پہلے کبھی MCV4 کا ٹیکہ نہیں لگوایا، ایک خوراک بائی اسکول میں داخلے وقت لگوانے کی سفارش کی جاتی ہے۔

دیگر وہ نوجوان بھی مدافعتی ٹیکے لے سکتے ہیں جو مینجیکوکل بیماری کے خدشے کو کم کرنا چاہتے ہیں۔

دیگر ان لوگوں کے لئے بھی مینجیکوکل مدافعتی ٹیکے کی سفارش کی جاتی ہے جن کو مینجیکوکل بیماری کا کافی خدشہ ہو:

- مشترکہ کمروں میں رہنے والے کالج کے نئے طلبا
- وہ مائیکروبیالوجسٹ جن کا سامنا مینجیکوکل بیکٹیریا سے عام طور پر ہوتا رہتا ہے۔
- امریکی فوج میں بھرتی ہونے والے افراد
- ہر وہ شخص جو دنیا کے ایسے حصے میں سفر کر رہا ہو یا وہاں رہتا ہو جہاں مینجیکوکل بیماری عام ہو، جیسے افریقہ کے کچھ حصے۔
- ہر وہ شخص جس کی تلی نقصان زدہ ہو یا جس کی تلی ہٹا دی گئی ہو۔
- وہ شخص جس کو ٹرمینل کومپلیمنٹ کومپونینٹ ڈیفنشنسی (Terminal Complement Component Deficiency) ہو جو مامونیت کے نظام کی ایک خرابی ہے۔
- وہ لوگ جو سرسام کی وبا پھیلنے کے دوران ممکنہ طور پر اس میں مبتلا رہے ہوں۔

خدشے کے ان گروپوں میں 11-55 سال کے افراد کے لئے MPSV4 ایک ترجیحی مدافعتی ٹیکہ ہے لیکن اگر MCV4 دستیاب نہ ہو تو MPSV4 استعمال کی جاسکتی ہے۔ MPSV4 کو 10-2 سال کے بچوں اور 55 سال سے زائد عمر کے بالغ افراد میں استعمال کرنا چاہئے جن کو خطرہ ہو۔

کتنی خوراکیں؟

2 سال اور زائد عمر کے لوگوں کو 1 خوراک لینا چاہئے۔ (بعض اوقات زیادہ خطرے والے لوگوں کے لئے ایک اضافی خوراک کی سفارش کی جاتی ہے۔ اپنے فراہم کنندہ سے دریافت کریں۔)

1 مینجیکوکل بیماری کیا ہوتی ہے؟

مینجیکوکل (بڈی کے نقص کے باعث دماغی جھلی کا بڑھانا) بیماری بیکٹیریا سے پیدا شدہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ یہ امریکہ میں 18-2 سال کے بچوں میں بیکٹیریائی سرسام (گردن توڑ بخار) (meningitis) پیدا کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔

سرسام دماغ اور حرام مغز کے ارد گرد موجود سیال مادے کی متعدی بیماری کا نام ہے۔ مینجیکوکل بیماری خون کی متعدی بیماری بھی پیدا کرتی ہے۔

امریکہ میں تقریباً 2,600 لوگ ہر سال مینجیکوکل بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 10-15% لوگ اینٹی بائیوٹکس سے علاج کے باوجود ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو زندہ بچتے ہیں، مزید 11-19% اپنے بازو یا ٹانگیں کھو بیٹھتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، انکے اعصابی نظام میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی طور پر معذور ہو جاتے ہیں، یا دوروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

مینجیکوکل بیماری کسی کو ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک سال سے کم عمر کے شیر خوار بچوں اور کچھ طبی حالتوں کے حامل افراد، جیسے تلی (Spleen) کی کمی کے شکار لوگوں میں سب سے زیادہ عام ہے۔ کالج کے نئے طالب علم جو مشترکہ کمروں میں رہتے ہیں، انہیں مینجیکوکل بیماری میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔

مینجیکوکل بیماری کا علاج پنسیلین (Penicillin) جیسی دوائیوں سے ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود، بیماری میں مبتلا ہونے والے میں دس سے 1 شخص اس سے ہلاک ہو جاتا ہے، اور کئی دوسرے زندگی بھر کے لئے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرے میں ہونے والے افراد میں مینجیکوکل مدافعتی ٹیکے کے استعمال کے ذریعے بیماری سے بچاؤ بہت ضروری ہے۔

2 مینجیکوکل مدافعتی ٹیکے

امریکہ میں دو مینجیکوکل مدافعتی ٹیکے دستیاب ہیں:

- مینجیکوکل پولیسپکرائڈ مدافعتی ٹیکہ (MPSV4) جو کہ 1970s سے دستیاب ہے۔
- مینجیکوکل کونجوگیٹ مدافعتی ٹیکہ (MCV4) جسے 2005 میں لائسنس دیا گیا تھا۔

دونوں مدافعتی ٹیکے 4 اقسام کی مینجیکوکل بیماری سے بچاتے ہیں، جن میں امریکہ میں سب سے خطرناک قسم کی 3 اقسام میں سے 2 اور ایک وہ قسم شامل ہے جو افریقہ میں وبا پھیلاتی ہے۔ مینجیکوکل مدافعتی ٹیکے تمام اقسام کی بیماری سے نہیں بچاتے۔ لیکن وہ کئی لوگوں کو ضرور بچالیتے ہیں جو اگر مدافعتی ٹیکہ حاصل نہ کریں تو بیمار ہو سکتے ہیں۔

مجھے کس چیز پر نظر رکھنی چاہئے؟

کوئی غیر معمولی حالت، جیسے تیز بخار یا طرز عمل کی تبدیلیاں۔
شدید الرجی کے رد عمل کی علامتوں میں سانس لینے میں مشکل،
گلا بیٹھنا ہونا یا اس طرح سانس لینا کہ سیٹی کی آواز نکلے،
چھپاکی، رنگ زرد ہونا، کمزوری، دل کی تیز دھڑکن یا غنودگی شامل
ہیں۔

مجھے کیا کرنا چاہئے؟

- ڈاکٹر کو فون کریں یا اس شخص کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔
- اپنے ڈاکٹر کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے، تاریخ اور وقت جب یہ واقع ہوا،
اور جب مدافعتی ٹیکہ دیا گیا تھا۔
- اپنے ڈاکٹر، نرس، یا محکمہ صحت کو کہیں کہ ایک مدافعتی ٹیکہ
کے ناموافق ردعمل کی اطلاع دینے کا نظام [Vaccine Adverse
Event Reporting System (VAERS) فارم جمع کروا کر اس رد عمل
کی اطلاع کریں۔

یا آپ یہ رپورٹ VAERS کی ویب سائٹ www.vaers.hhs.gov کے
ذریعے یا 1-800-822-7967 پر فون کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔

VAERS طبی مشورہ نہیں دیتا۔

7 میں مزید کیسے جان سکتا ہوں؟

- اپنے ڈاکٹر یا نرس سے دریافت کریں وہ آپ کو مدافعتی ٹیکہ کے
پیکج میں شامل معلومات دے سکتے ہیں یا معلومات کے دیگر
ذرائع تجویز کر سکتے ہیں۔
- اپنے مقامی یا ریاستی محکمہ صحت کو فون کریں۔
- بیماری پر قابو اور پریویز کے مراکز (CDC) سے رابطہ کریں:
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) پر فون کریں۔
- CDC کے قومی پروگرام برائے مامونیت کی ویب سائٹ کو
www.cdc.gov/nip پر ملاحظہ کریں۔
- CDC کی میننجیکوکل بیماری کی ویب سائٹ کو
www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/meningococcal_g.htm
پر ملاحظہ کریں۔
- CDC کی مسافروں کی صحت کی ویب سائٹ www.cdc.gov/travel
ملاحظہ کریں۔



محکمہ صحت و انسانی خدمات

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

بیماری پر قابو اور پریویز کے مراکز

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

3 ماہ سے 2 سال کے بچوں کے لئے خصوصی حالات میں MPSV4 کی
سفارش کی جاسکتی ہے۔ ان بچوں کو 3 ماہ کے وقفے سے 2 خوراکیں
دینی چاہئیں۔

4 بعض لوگوں کو میننجیکوکل مدافعتی ٹیکہ نہیں لینا چاہئے یا انتظار کرنا چاہئے

- اگر کسی شخص کو ان دونوں میں سے کسی ایک بھی میننجیکوکل
مدافعتی ٹیکے کی ایک گذشتہ خوراک سے کوئی شدید الرجک رد
عمل (زندگی کو خطرے میں ڈالنے والا) ہوا ہو، تو اسے ایک اور
خوراک نہیں لیننی چاہئے۔
- اگر کسی شخص کو مدافعتی ٹیکہ کے کسی حصے سے کوئی شدید
الرجی (زندگی کو خطرے میں ڈالنے والا) ہوئی ہو، تو اسے مدافعتی
ٹیکہ نہیں لینا چاہئے۔ اگر آپ کو شدید الرجی ہو تو اپنے ڈاکٹر کو
بتائیں۔
- اگر کوئی شخص ٹیکہ لگوانے کے وقت معتدل طور پر یا شدید بیمار
ہو تو اس کو غالباً بحالی تک انتظار کرنا چاہئے۔ اپنے ڈاکٹر یا نرس
سے دریافت کریں۔ ہلکی بیماری والے افراد عام طور پر مدافعتی ٹیکہ
لے سکتے ہیں۔
- اگر کوئی جولیان بار سنڈروم (بیماری) میں کبھی مبتلا رہا ہو تو اس
کو MCV4 لینے سے قبل اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہئے۔
- میننجیکوکل مدافعتی ٹیکے حاملہ عورتوں کو دیا جاسکتا ہیں۔ تاہم
MCV4 ایک نیا مدافعتی ٹیکہ ہے اور اس پر حاملہ عورتوں کے لئے
اتنی تحقیق نہیں کی گئی جتنی MPSV4 پر۔ اس کو اس وقت
استعمال کرنا چاہئے جب یہ واضح طور پر درکار ہو۔
- میننجیکوکل مدافعتی ٹیکے دوسری مدافعتی ٹیکوں کے ساتھ اسی
وقت دیے جاسکتے ہیں۔

5 میننجیکوکل مدافعتی ٹیکوں سے کون سے خطرات لاحق ہیں؟

ایک مدافعتی ٹیکہ، کسی بھی دوا کی طرح، ممکنہ طور پر خطرناک
مسائل، مثلاً شدید الرجک رد عمل پیدا کر سکتا ہے۔ میننجیکوکل
مدافعتی ٹیکہ سے خطرناک نقصان، یا موت کا انتہائی قلیل احتمال ہے۔

ہلکے مسائل

میننجیکوکل مدافعتی ٹیکہ لینے والے تقریباً نصف لوگوں پر ہلکے
ضمنی اثرات ہوتے ہیں مثلاً ٹیکہ لگوانے والی جگہ پر سرخی یا درد۔
اگر یہ مسائل ہو جائیں تو یہ عموماً 1 یا 2 دن تک رہتے ہیں۔ یہ
MPSV4 کی نسبت MCV4 کے بعد زیادہ عام ہیں۔
مدافعتی ٹیکہ لینے والوں کی ایک قلیل فی صد کو بخار ہو جاتا ہے۔

شدید مسائل

- ٹیکے کے چند منٹوں سے لے کر چند گھنٹوں تک شدید الرجک رد
عمل، بہت شاذونادر ہوتے ہیں۔
- MCV4 لگوانے والے کچھ افراد میں جولیان بار سنڈروم یا (GBS)
نامی ایک شدید اعصابی نقص کی اطلاع ملی ہے۔ یہ اتنا کم ہوتا ہے
کہ اس وقت یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا مدافعتی ٹیکہ اس کا باعث ہو
سکتا ہے۔ اگر یہ ہو بھی، تو خطرہ بہت قلیل ہے۔

مدافعتی ٹیکے کی معلومات کا بیان (عارضی)